

Sortimentsprüfung - Kissen-Astern

Art/Sorte:

Standort: Quartier:

Beobachtungsjahr		2003	2004	2005	Mittelwert	x Faktor	Endwert
Überwinterungsverhalten	1 x					1	
Reichblütigkeit	1 x					2	
Blütenschmuckwirkung	1 x					2	
Widerstandsfähigkeit gg. Krankheiten/Schädlingen	1 x					4	
Wüchsigkeit/Vitalität	1 x					2	
Gesamteindruck	1 x					3	
Summe							

Mittlere Höhe zur Blütezeit:

(im 2. oder 3. Standjahr)cm

Blütezeit: Jahr: Blühbeginn: Blühende:
 (20% der Blüten geöffnet) (80% der Blüten verblüht)

Jahr: Blühbeginn: Blühende:

Jahr: Blühbeginn: Blühende:

Blütenfarbe:

Ausbreitung/

Wuchsverhalten:

Tendenz zur Tonsur-
bildung/Verkahlen:

Bemerkungen:

Zusammenfassender Bewertungsvorschlag: (zum Abschluß der Sichtung)	
--	--

Anleitung zur Bewertung

Überwinterungsverhalten:

Bonitur nach Austrieb.

- 1 = sehr schlecht (alle Pflanzen ausgefallen)
- 3 = schlecht (stark lückiger Bestand)
- 5 = mäßig (einzelne Pflanzen geschädigt)
- 7 = gut (geringe Schäden einzelner Pflanzen)
- 9 = sehr gut (keine Schäden erkennbar)

Wüchsigkeit/Vitalität:

Einmalige Bonitur zur Blütezeit.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = stark
- 9 = sehr stark

Reichblütigkeit:

Einmalige Bonitur jährlich zur Vollblüte.

- 1 = schlecht
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = gut
- 9 = sehr gut

Gesamteindruck:

Einmalige Bonitur zur Blütezeit.

- 1 = sehr schlecht
- 3 = schlecht
- 5 = mittel
- 7 = gut
- 9 = sehr gut

Blütenschmuckwirkung:

Einmalige Bonitur jährlich zur Vollblüte.

- 1 = ohne Zierwert
- 3 = geringer Zierwert
- 5 = mittlerer Zierwert
- 7 = hoher Zierwert
- 9 = sehr hoher Zierwert

Bewertungsvorschlag:

- *** ausgezeichnet
- ** sehr gut
- * gut
- Li Liebhabersorte
- Lo Lokalsorte
- φ entbehrliche Sorte

Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten/Schädlingen:

Bonitur zur Blütezeit.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = hoch
- 9 = sehr hoch

Niedrigster Wert: 1

Ein Strich ist nur einzutragen, wenn das Merkmal an einem Bonitierungstag nicht bonitierbar ist.

