

Hakonechloa-Sortimentsprüfung

Art: Sorte:

Standort: Quartier:

Beobachtungsjahr	2016	2017	2018	Mittelwert	x Faktor	Endwert
Überwinterungsverhalten					1	
Blattschmuckwirkung Frühsommer					1	
Blattschmuckwirkung Frühherbst					1	
Standfestigkeit					1	
Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten					1	
Wüchsigkeit/Vitalität					1	
Gesamteindruck					3	
Summe						

Mittlere Höhe zur Blüte:
(im 3. Standjahr)cm

Blütezeit: Blühbeginn:

(im 3. Standjahr)
Blütenbildung/
Schmuckwirkung

Herbstfärbung/
Winterschmuck:

Ausbreitung: schwach mittel stark

Bemerkungen:
(z.B. Austriebsbeginn, Intensität der Blatt-
panaschierung etc.)

Stabilität Panaschierung: ja nein

**Zusammenfassender
Bewertungsvorschlag**

Anleitung zur Bewertung

Überwinterungsverhalten:

Bonitur nach Austrieb.

- 1 = sehr schlecht (alle Pflanzen ausgefallen)
- 3 = schlecht (stark lückiger Bestand)
- 5 = mäßig (einzelne Pflanzen geschädigt)
- 7 = gut (geringe Schäden einzelner Pflanzen)
- 9 = sehr gut (keine Schäden erkennbar)

Blattschmuckwirkung:

Jährliche Bonitur im Frühsommer und im Frühherbst.

- 1 = ohne Zierwert
- 3 = geringer Zierwert
- 5 = mittlerer Zierwert
- 7 = hoher Zierwert
- 9 = sehr hoher Zierwert

Standfestigkeit:

Jährliche Bonitur im Frühherbst.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = hoch
- 9 = sehr hoch

Widerstandsfähigkeit gegenüber

Krankheiten:

Jährliche Bonitur im Frühherbst.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = hoch
- 9 = sehr hoch

Wüchsigkeit/Vitalität:

Jährliche Bonitur im Frühherbst.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = hoch
- 9 = sehr hoch

Gesamteindruck:

Jährliche Bonitur im Frühherbst.

- 1 = sehr schlecht
- 3 = schlecht
- 5 = mittel
- 7 = gut
- 9 = sehr gut

Bewertungsvorschlag:

- *** ausgezeichnet
- ** sehr gut
- * gut
- Li Liebhabersorte
- Lo Lokalsorte
- ϕ entbehrliche Sorte

Niedrigster Wert: 1

Ein Strich ist nur einzutragen, wenn das Merkmal an einem Bonitierungstag nicht bonitierbar ist

